

อย่าวางใจ!

เรามีความเสี่ยง โรคไตเรื้อรังหรือไม่



ตรวจสอบสมุนไพรมะเร็ง
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร



เพิ่มเพื่อนปรึกษาเภสัชกร
ผ่าน Telepharmacy



Thai CKD Risk Score *

*โปรแกรมประเมินความเสี่ยงโรคไตอัจฉริยะ- คำนวณโดยใช้ฐานข้อมูลจากคนไทย
ที่เก็บรวบรวมมายาวนานกว่ายี่สิบปี พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการ อาการปวด ในร้านยาวิชาชีพ

ระดับความปวด Numeric pain scale

ค่าไต/ pain score	1-3 (Mild)	4-6 (Moderate)	7-10 (Severe)
ระยะ: 1 (> 90)	ปวดเล็กน้อย ยับยั้งถึงปวด	ปวดปานกลาง ปวดเรื่อยๆ พอร้าคาญ	ปวดมาก รุนแรง จนทนไม่ได้
ระยะ: 2 (60-89)	หมวดประคบร้อน เย็น Topical NSAIDs ครีมไพล เจลพริก	NSAIDs ออกฤทธิ์สั้น เช่น Ibuprofen 200 mg ทุก 6 ชม. เฉพาะเมื่อมีอาการปวด	ยากกลุ่ม Opioids tramadol 50 mg. เฉพาะเมื่อมีอาการปวด
ระยะ: 3 (30-59)	Paracetamol ยากคลายกล้ามเนื้อ เช่น Orphenadrine	ยากกลุ่ม Opioids เช่น tramadol 37.5 mg + paracetamol 325 mg	
ระยะ: 4 (15-29)	เป็นต้น ใช้เฉพาะเมื่อ มีอาการเท่านั้น	เฉพาะเมื่อมีอาการปวด	
ระยะ: 5 (<15)			

ห้ามใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ในผู้ป่วยไตเสื่อม ระยะ 3-5

